



**PAPDI**

Perhimpunan Dokter Spesialis  
Penyakit Dalam Indonesia



Rekomendasi PAPDI  
tentang Pemberian Vaksinasi

# COVID-19 Booster Kedua

## Pertimbangan PAPDI Pemberian Vaksinasi COVID-19 *Booster* Kedua :



1 **Meningkatnya kejadian infeksi** pada tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi *booster* pertama



2 Jumlah kasus COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia seiring dengan munculnya varian baru **Omicron BA.4** dan **BA.5**

## Poin rekomendasi PAPDI dalam hal penggunaan Vaksinasi COVID-19 *Booster* Kedua :

- 1 Protokol kesehatan harus tetap **dilaksanakan secara konsisten** kedepannya
- 2 **Vaksin *booster* pertama perlu ditingkatkan cakupannya** dan diprioritaskan untuk diselesaikan
- 3 Vaksin *booster* kedua dapat diberikan minimal **6 bulan** setelah *booster* pertama
- 4 **Prioritas vaksin *booster* kedua** adalah kelompok lanjut usia, kelompok dengan komorbid, imunokompromais dan tenaga kesehatan
- 5 **Platform vaksinasi *booster* kedua** diberikan sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan RI

